

RELVA GRANULE

Porosty bez plevelů - snadněji to již nejde...

Výhody použití:

- 💧 Snadná aplikace rozhozem
- 💧 Použití ve velkém počtu druhů a kultivarů okrasných rostlin, keřů a jehličnanů
- 💧 Dobrá účinnost a dlouhá doba působení proti plevelům



Při nákupu 40 kg
Relva Granule získáte
**rozmetadlo Solo 421
ZDARMA**

RELVA GRANULE

Relva Granule je reziduální herbicid ve formě granulí k přímému použití rozhozem pro preemergentní hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v lesnictví (lesní dřeviny, lesní školky), v městské vegetaci a v produkci okrasných dřevin

Působení

Relva Granule je systémový herbicid. Jednoděložné a dvouděložné plevele účinnou látku propyzamide absorbují přes kořenovou soustavu a ta je následně rozvedena v rostlině.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: lipnice roční, pýr plazivý, medyněk vlnatý, medyněk měkký, pohánka hřebenitá, ovsík vyvýšený, psárka luční, lipnice obecná, tomka vonná, metlice trsnatá, třtina křovištní, opletka obecná, šťovík tupolistý, ptačinec prostřední, šťovík kadeřavý, přeslička rolní, rdesno červivec, kopřiva žahavka, psineček obecný, trojštět žlutavý, srha laločnatá, kostřava, smilka, bezkolenec modrý, jílky sveřep měkký, bojínek luční, metlička křivolaká, lilek potměchuť, lilek černý, svízel přítula, pryskyřník plazivý, merlík bílý, rozrazil, šťovík menší

Plevele méně citlivé: zemědým lékařský, kokoška pastuší tobolka, šáchorovitě

Použití a dávkování

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k šO
lesní dřeviny, lesní školky	plevele jednoděložné a dvouděložné	37,5 kg/ha	AT	1) postemergentně 2) preemergentně
okrasné dřeviny, školky	plevele jednoděložné a dvouděložné	37,5 kg/ha	AT	1) postemergentně 2) preemergentně

Doporučení pro aplikaci

Relva Granule se aplikuje rovnoměrným rozhozem po ošetřované ploše 1× za sezónu v období od 1. 10. do 31. 1.

Lesní dřeviny, lesní školky - ošetřované kultury musejí být min. 4 týdny zakořeněné.

Okrasné dřeviny - školky: na konečném stanovišti min. 1 rok, v případě sázení na jaře mohou být ošetřeny na podzim v roce výsadby.

Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid je srážkami aktivován.

Neaplikujte na zasněženou nebo umrzlou půdu - možnost fytotoxicity.

Nabídka okrasných rostlin je velká a jejich citlivost může být variabilní i v rámci jednoho druhu. Pokud u daného kultivaru nebyla získána žádná zkušenost s účinnou látkou propyzamide, měla by být provedena zkušební aplikace pro testování tolerance.

Nedoporučujeme použití herbicidu Relva Granule v následujících druzích okrasných rostlin: *Coluta*, *Cornus alba*, *Cotoneaster*, *Escallonia*, *Kerria*, *Spiraea* spp.

Citlivost druhů a odrůd ošetřovaných dřevin konzultujte s držitelem registrace.