



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Anna Horáková /545 110 424

E-MAIL: anna.horakova@ukzuz.cz

DATUM: 5. 5. 2017

Relva Granule – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
lesní dřeviny, lesní školky	plevele jednoděložné, plevy dvouděložné	37,5 kg/ha	AT	1) postemergentně 2) preemergentně	
okrasné dřeviny, okrasné dřeviny - školky	plevele jednoděložné, plevy dvouděložné	37,5 kg/ha	AT	1) postemergentně 2) preemergentně	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
lesní dřeviny, lesní školky, okrasné dřeviny	rozhoz	1x za sezónu, od 1. 10. do 31. 1.

Spektrum účinnosti:

Plevy citlivé: lipnice roční, pýr plazivý, medyněk vlnatý, medyněk měkký, pohánka hřebenitá, ovsík vyvýšený, psárka luční, lipnice obecná, tomka vonná, metlice trsnatá, třtina křovištní, opletka obecná, šťovík tupolistý, ptačinec prostřední, šťovík kadeřavý, přeslička rolní, rdesno červivec, kopřiva žahavka, psineček obecný, trojštět žlutavý, srha laločnatá, kostřava, smilka, bezkolenek modrý, jílky sveřep měkký, bojínek luční, metlička křivolaká, lilek potměchuť, lilek černý, svízel přítula, pryskyřník plazivý, merlík bílý, rozrazil, šťovík menší

Plevy méně citlivé: zemědělní lékařský, kokoška pastušská, šachorovitě

Lesní dřeviny, lesní školky - ošetřované kultury musejí být min. 4 týdny zakořeněné
Okrasné dřeviny, okrasné dřeviny - školky: na konečném stanovišti min. 1 rok,
v případě sázení na jaře mohou být ošetřeny na podzim

Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním, nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován.

Neaplikujte na zasněženou nebo umrzlou půdu, nebo když se předpokládá tání – možnost fytotoxicity.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Citlivost druhů a odrůd ošetřovaných dřevin konzultujte s držitelem povolení.

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

V případě pěstování následných plodin je nutné dodržet tyto intervaly od poslední aplikace:

Salát – 0 týdnů

Hrách, bob, fazol, ředkev/ředkvička, čekanka, jetel, vojtěška – 10 týdnů

Zelenina košťálová, pór, cibule, celer, pastinák, petržel, řepka olejka, jahody – 25 týdnů, nebo setí/sázení po 15. 6., podle toho, co nastane dříve

Obilniny a trávy – 30 týdnů, před setím je nutná orba do 15 cm

Ostatní plodiny – 40 týdnů, před setím je nutná orba do 15 cm

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek se aplikuje rozhozem.